

D'autres espèces sont aussi concernées :

Goéland railleur



Huitrier pie



Sterne de dougall



Sterne caugek



Sterne hansel



Sterne pierregarin



Grand Gravelot



Petit Gravelot



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Conservatoire du
littoral



ATTENTION ON MARCHE SUR DES ŒUFS !

Entre le 1^{er} avril et le 15 août, les gravelots et autres oiseaux du littoral pondent et élèvent leurs poussins sur cette plage. Nos activités récréatives peuvent constituer une menace pour eux.

Aidez-nous à protéger les nichées :

- Respectez le balisage de protection mis en place (Respect protected area)
- Tenez votre chien en laisse (keep your dog on a leash)
- Marchez plutôt le long du fil de l'eau (Avoid walking upper the tide mark)

Quizz : avez-vous trouvé le nid sur la photo ?



Le Gravelot à collier interrompu


Charadrius alexandrinus



Identification

- Petit limicole haut sur pattes grises ;
- Son plumage est brun dessus avec une tête plus claire ;
- Le dessous est blanc pur ;
- Le front est blanc surligné d'un bandeau noir ;
- Un collier noir est visible sur les épaule et s'arrête avant la gorge.

Attention ! Cette espèce peut être confondue avec deux autres espèces nicheuses en France : le Grand gravelot (*Charadrius hiaticula*) et le Petit gravelot (*Charadrius dubius*).




Cette espèce est exclusivement liée au littoral où elle se reproduit en Europe, au Maghreb, en Asie et jusqu'en Chine. En France, l'ensemble du littoral accueille l'espèce, excepté pour la côte des Pyrénées-Atlantiques.

En France et en Europe, les populations sont jugées en déclin et vulnérables.



La Sterne naine

Sterna albifrons




Identification

La plus petite sterne de France :

- Vol rapide et saccadé ;
- Bec jaune vif à petite pointe noire ;
- Calotte noire avec un front blanc se prolongeant en pointe au-dessus de l'œil ;
- Corps paraissant entièrement blanc ;
- Queue fourchue.

Attention ! A grande distance cette espèce peut être confondue avec la Guifette moustac (*Chlidonias hybrida*), qui a cependant les ailes moins pointues et un vol plus papillonnant.



La Sterne naine se reproduit dans toute l'Europe, le long des côtes et des rivières offrant des îlots sableux pendant la période d'étiage.

En France, sa distribution se limite principalement au cours de la Loire avec ses principaux affluents, au littoral méditerranéen, à quelques stations sur le littoral atlantique et plus occasionnellement dans d'autres départements intérieurs.

